


# ANCELOTTA



Azienda Agricola Vivai  
**MORONI**  
di Moroni Rolando

I-FEDIT 18  
C.S.G.

## Campo di omologazione e confronto

Ubicazione	-
Forma di allevamento	-
Densità di impianto (ceppi/ha)	-
Periodo di osservazione	-

## Caratteristiche distintive rispetto alla media della popolazione

Vigoroso

Produttività medio-elevate e costante


Raramente manifesta colatura

Scarsa suscettibilità alla botrite



Fonte:

# ANCELOTTA



Azienda Agricola Vivai  
**MORONI**  
di Moroni Rolando

I-FEDIT 18  
C.S.G.

## Fase fenologica

## Epoca

Germogliamento  
Fioritura  
Invaiaatura  
Maturazione

-  
-  
-  
-

## Suscettibilità malattie crittogamiche (%)

## Clone

Botrite  
Oidio

-  
-

## Caratteristiche produttive

## Clone

Fertilità reale  
Produzione per ceppo (kg)  
Numero grappoli/ceppo  
Peso medio grappolo (g)  
Peso medio acino (g)  
Peso legno potatura (kg/ceppo)  
Indice di Ravaz

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

## Parametri Enochimici


## Clone

Zuccheri ( ° Brix)  
pH  
Acidità totale (g/l)  
Ac. Tartarico (g/l)  
Ac. Malico (g/l)  
Antociani totali (mg/l)  
Polifenoli totale (mg/l)

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

Fonte:

# ANCELOTTA N.



Azienda Agricola Vivai  
**MORONI**  
di Moroni Rolando

I-FEDIT 18  
C.S.G.

## ANALISI SENSORIALE

### Descrizione organolettica

Si ottiene un vino dal colore rosso molto intenso, ricco di fruttato, vinoso, particolarmente adatto al taglio con altri prodotti, quali Lambrusco, Merlot e Barbera, cui apporta colore e alcol. Si presta per la produzione di vino frizzante.

Fonte:

