


VARIETÀ TREBBIANO TOSCANO B.



Azienda Agricola Vivai
MORONI
di Moroni Rolando

1 TN 8

Campo di omologazione e confronto

Ubicazione

Forma di allevamento doppio capovolto

Densità di impianto (ceppi/ha)

Periodo di osservazione

Caratteristiche distintive rispetto alla media della popolazione

Grappolo medio - grande, allungato quasi sempre con un'ala lunga, non troppo compatto, con peduncolo visibile

Acino medio, sferoide, con buccia sottile e pruinosa di colore giallo-verde

Vigoria ottima


Fertilità buona

Produttività elevata



Fonte:

VARIETÀ TREBBIANO TOSCANO B.



Azienda Agricola Vivai
MORONI
di Moroni Rolando

1 TN
8

Fase fenologica

Germogliamento
Fioritura
Invasatura
Maturazione

Epoca

I decade aprile
I decade giugno
III decade agosto
I decade di ottobre

Suscettibilità malattie crittogamiche (%)

Botrite
Oidio

Clone

Normale
Normale

Caratteristiche produttive

Fertilità reale
Produzione per ceppo (kg)
Numero grappoli/ceppo
Peso medio grappolo (g)
Peso medio acino (g)
Peso legno potatura (kg/ceppo)
Indice di Ravaz

Clone

-
10,5
-
320
2,9
-
-

Parametri Enochimici


Zuccheri (° Brix)
pH
Acidità totale (g/l)
Ac. Tartarico (g/l)
Ac. Malico (g/l)
Antociani totali (mg/l)
Polifenoli totale (mg/l)

Clone

24
-
5
-
-
-
-

Fonte:

VARIETÀ TREBBIANO TOSCANO B.




Azienda Agricola Vivai
MORONI
di Moroni Rolando

1 TN
8

ANALISI SENSORIALE

ANALISI SENSORIALE T-N-8



Descrizione organolettica

Il vino che se ne ottiene è di colore giallo oro, alcolicità media, acidità elevata, profumo neutro.